



Анализ рынка местных анестетиков применяемых в стоматологии

Выполнила:

ФИО

Научный руководитель проекта:

ФИО



АКТУАЛЬНОСТЬ

За последние годы на фармацевтическом рынке России значительно увеличился ассортимент местноанестезирующих препаратов, что облегчает выбор средств и методов обезболивания. Именно поэтому важно знать ассортимент рынка местных анестетиков применяемых в стоматологии



ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

Цель – провести анализ рынка местных анестетиков применяемых в стоматологии.


Задачи:

1. Рассмотреть общую характеристику местных анестетиков применяемых в стоматологии;
2. Проанализировать ассортимент местных анестетиков для применения в стоматологии;
3. Изучить анализ предложений на рынке местных анестетиков применяемых в стоматологии.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Классификация способов местной анестезии:


Отечественная классификация способов местной анестезии, используемых в стоматологии



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Классификация способов местной анестезии:

Зарубежная классификация способов местной анестезии, используемых в стоматологии





АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для применения в стоматологии:

АРТИКАИН, БИОХИМИК (Россия)



Активное вещество: артикаин (articaine)
Лекарственная
форма

АРТИКАИН	р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: амп. 2 мл 5 или 10 шт.
	рег. №: ЛП-001151 от 11.11.11 - Действующее

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций	1 мл
артикаина гидрохлорид	40 мг

АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для применения в стоматологии:

АРТИКАИН, БИНЕРГИЯ, ЗАО (Россия)



Активное вещество: артикаин (articaine)

Лекарственная
форма

АРТИКАИН	р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: 1.7 мл картриджи 10, 50 или 100 шт., 1 мл или 2 мл амп. 5, 10, 100 или 250 шт.
	рег. №: ЛСП-008522/10 от 23.08.10 - Срок действия рег. уд. не ограничен
	Срок годности, состав и упаковка

Раствор для инъекций прозрачный, бесцветный или с желтоватым оттенком.	1 мл
артикаина гидрохлорид	40 мг



АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для применения в стоматологии:

АРТИКАИН ДФ, ХИРАТРЕЙД, ООО СП (Россия)



- артикаин (articaine)
- эпинефрин (epinephrine)

Лекарственная
форма

АРТИКАИН ДФ

р-р д/инъекц. 40 мг+0.01 мг/1 мл: картридж
1.8 мл 50 шт.

рег. №: ЛП-001074 от 28.10.11 - Действующее

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций прозрачный бесцветный, без запаха.	1 мл
артикаина гидрохлорид	40.0 мг
эпинефрин (д-формы гидрохлорида)	0.010 мг

АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для применения в стоматологии:

АРТИКАИН ПЕРРЕЛЬ С АДРЕНАЛИНОМ, PIERREL FARMACEUTICI, S.p.A. (Италия)



- артикаин (articaine)
- эпинефрин (epinephrine)

Лекарственная
форма

АРТИКАИН ПЕРРЕЛЬ
С АДРЕНАЛИНОМ

р-р д/инъекц. 40 мг+0.01 мг/1 мл: 1.8 мл
картридж 100 шт.
рег. №: ЛСР-004839/10 от 27.05.10 -
Действующее

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций прозрачный, бесцветный.	1 мл
артикаина гидрохлорид	40.0 мг
эпинефрин (в форме гидрохлорида)	0.01 мг



АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для применения в стоматологии:

БРИЛОКАИН-АДРЕНАЛИН, БРЫНЦАЛОВ-А, ЗАО (Россия)



- артикаин (articaine)
- эпинефрин (epinephrine)

Лекарственная
форма

БРИЛОКАИН-
АДРЕНАЛИН

р-р д/инъекц. 40 мг+5 мкг/1 мл: картриджи
1.7 мл или 1.8 мл
рег. №: Р N000688/01-2001 от 08.07.08 - Срок
действия рег. уд. не ограничен

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций	1 мл
эпинефрин (в форме битартрата)	5 мкг
артикаин	40 мг

АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для применения в стоматологии:

МЕПИВАСТЕЗИН, JERUSALEM PHARMACEUTICAL COMPANY (JERHARM) (Палестина)

•мепивакаин



Лекарственная
форма

МЕПИВАСТЕЗИН

р-р д/инъекц. 30 мг/1 мл: картриджи 1.7 мл 50 шт.
рег. №: П №011570/01 от 06.12.07 -
Действующее

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций	1 мл
мепивакаина гидрохлорид	30 мг

АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для применения в стоматологии:

ПРИМАКАИН С АДРЕНАЛИНОМ, PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND (Франция)



- артикаин (articaine)
- эпинефрин (epinephrine)

Лекарственная
форма

ПРИМАКАИН С
АДРЕНАЛИНОМ

р-р д/инъекц. 40 мг+5 мкг/1 мл: картридж 1.7 мл 50 шт.
рег. №: П N011701/01 от 08.09.09 - Срок действия рег. уд. не ограничен

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций	1 мл
артикаина гидрохлорид	40 мг
эпинефрин (в форме гидротартрата)	5 мкг

АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для применения в стоматологии:

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ, SEPTODONT (Франция)



- артикаин (articaine)
- эпинефрин (epinephrine)

Лекарственная
форма

СЕПТАНЕСТ С
АДРЕНАЛИНОМ

р-р д/инъекц. 40 мг+5 мкг/1 мл: картридж 1.8
мл 10 или 50 шт.
рег. №: П №012998/01 от 09.07.07 -
Действующее

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций	1 мл
артикаин	40 мг
эпинефрин (в форме гидрохлорида)	5 мкг



АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для
применения в стоматологии:

СКАНДИНИБСА (SCANDINIBSA), LABORATORY INIBSA, S.A. (Испания)

•мепивакаин



Лекарственная
форма

СКАНДИНИБСА

р-р д/инъекц. 30 мг/1 мл: картриджи 1.8 мл 10 шт.
рег. №: ЛСР-010989/09 от 31.12.09 -
Действующее

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций	1 мл
мепивакаина гидрохлорид	30 мг

АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для применения в стоматологии:

СКАНДОНЕСТ (SCANDONEST), SEPTODONT (Франция)

•мепивакаин

Лекарственная
форма

СКАНДОНЕСТ

р-р д/инъекц. 3%: картриджи 1.8 мл 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 или 120 шт.
рег. №: П №012996/01 от 11.02.08 -
Действующее

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций 3%

1 мл

мепивакаина гидрохлорид

30 мг





АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Ассортимент и характеристика местных анестетиков для
применения в стоматологии:

УЛЬТРАКАИН Д (ULTRACAIN D), SANOFI-AVENTIS Deutschland, GmbH (Германия)



•артикаин

Лекарственная
форма

УЛЬТРАКАИН® Д

р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: картриджи 1.7 мл 10
или 100 шт.
рег. №: ЛС-001358 от 03.04.11 - Срок действия
рег. уд. не ограничен

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций прозрачный,
бесцветный

1 мл

артикаина гидрохлорид

40 мг



АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Анализ предложений на рынке местных анестетиков применяемых в стоматологии:

Производители, представленные на рынке местных анестетиков применяемых в стоматологии

Страна	Препарат	Название	Всего производителей
Россия	Артикаин, Брилокаин- адреналин	Биохимик, Бинергия, Альтаир, Брынцалов-А	3
Бразилия	Артикаин ДФ	INDUSTRIA E COMERCIO DFL S.A.	1
Италия	Артикаин ПЕРРЕЛЬ	PIERREL FARMACEUTICI	1
Палестина	Мепивастезин	JERUSALEM PHARMACEUTICAL COMPANY (JEPHARM)	1
Франция	Примакаин, Септанест, Скандонест	Produits dentaires pierre rolland, Septodont	2



АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Анализ предложений на рынке местных анестетиков применяемых в стоматологии:

Название	Форма выпуска
АРТИКАИН	р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: амп. 2 мл 5 или 10 шт.
АРТИКАИН	р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: 1.7 мл картриджи 10, 50 или 100 шт., 1 мл или 2 мл амп. 5, 10, 100 или 250 шт.
АРТИКАИН	р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: 1.7 мл картриджи 10, 50 или 100 шт., 1 мл или 2 мл амп. 5, 10, 100 или 250 шт.
АРТИКАИН ДФ	р-р д/инъекц. 40 мг+0.01 мг/1 мл: картридж 1.8 мл 50 шт.
АРТИКАИН ПЕРРЕЛЬ С АДРЕНАЛИНОМ	р-р д/инъекц. 40 мг+0.01 мг/1 мл: 1.8 мл картридж 100 шт.
АРТИКАИН ПЕРРЕЛЬ С АДРЕНАЛИНОМ	р-р д/инъекц. 40 мг+0.005 мг/1 мл: 1.8 мл картридж 100 шт.
БРИЛОКАИН-АДРЕНАЛИН	р-р д/инъекц. 40 мг+5 мкг/1 мл: картриджи 1.7 мл или 1.8 мл
БРИЛОКАИН-АДРЕНАЛИН ФОРТЕ	р-р д/инъекц. 40 мг+10 мкг/1 мл: картриджи 1.7 мл или 1.8 мл
МЕПИВАСТЕЗИН	р-р д/инъекц. 30 мг/1 мл: картриджи 1.7 мл 50 шт.
ПРИМАКАИН С АДРЕНАЛИНОМ	р-р д/инъекц. 40 мг+5 мкг/1 мл: картридж 1.7 мл 50 шт.
ПРИМАКАИН С АДРЕНАЛИНОМ	р-р д/инъекц. 40 мг+10 мкг/1 мл: картридж 1.7 мл 50 шт.
СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ	р-р д/инъекц. 40 мг+5 мкг/1 мл: картридж 1.8 мл 10 или 50 шт.
СКАНДИНИБСА	р-р д/инъекц. 30 мг/1 мл: картриджи 1.8 мл 10 шт.
СКАНДИНИБСА ФОРТЕ	р-р д/инъекц. 20 мг+10 мкг/1 мл: картриджи 1.8 мл 10 шт.
СКАНДОНЕСТ	р-р д/инъекц. 3%: картриджи 1.8 мл 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 или 120 шт.
УЛЬТРАКАИН® Л	р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: картриджи 1.7 мл 10 или 100 шт.



АНАЛИЗ РЫНКА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ

Анализ предложений на рынке местных анестетиков
применяемых в стоматологии:

**Производители, представленные на рынке местных анестетиков
применяемых в стоматологии**

Название	Владелец рег/уд	Цена, руб.
АРТИКАИН	БИОХИМИК (Россия)	312
АРТИКАИН ПЕРРЕЛЬ С АДРЕНАЛИНОМ	PIERREL FARMACEUTICI (Италия)	2497
БРИЛОКАИН-АДРЕНАЛИН	БРЫНЦАЛОВ-А (Россия)	от 900 до 1250
ПРИМАКАИН С АДРЕНАЛИНОМ	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND (Франция)	1613
СКАНДИНИБСА	LABORATORY INIBSA (Испания)	2592
УЛЬТРАКАИН® Д	SANOFI-AVENTIS Deutschland (Германия) представительство: САНОФИ	1 348



Анализ и оценка финансовых результатов деятельности предприятия

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!