

ВУЗ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:
«Технология кормления и содержания
подсосных свиноматок в условиях предприятия
ООО «Белгранкорм»»

Выполнена:

Научный руководитель:


Цель и задачи

Целью - изучить организацию и эффективность производства продукции свиноводства в ОАО «Белгранкорм».

Задачи:

- изучить производственно-хозяйственную деятельности предприятия;
- рассмотреть систему содержания подсосных свиноматок и поросят-сосунов;
- рассмотреть систему кормления подсосных свиноматок

Признаки определения наступления родов (опороса)



за 1-2 дня наружные половые органы набухают, приобретают розово-красный цвет;

из половой щели начинает выделяться прозрачная слизь и в виде тягучей нити;

молочные железы становятся уплотненными, резко очерченными;

соски увеличиваются и темнеют;

свиноматка беспокоится, роет пол (готовит гнездо);

наличие в сосках молозива говорит о том, что через несколько часов должен наступить опорос

Случаи, когда необходимо стимулировать опорос свиноматок

если свиноматка достигла 116 дня супоросности и не опоросилась (для предотвращения осложненных родов из-за более крупных поросят);

если последние не опоросившиеся свиноматки в секции достигли 114 и более дня супоросности

Случаи, когда проводится отсад/подсад

поросят больше, чем сосков у свиноматки;



агрессивное
поведение свиноматки

Параметры микроклимата в цехе опороса

Вид животного			Скорость движения воздуха, м/с					
			зима	лето				
Подсосные	Температура, С							
	Относительная влажность, %							
					Освещенность, люкс			
						Допустимое содержание аммиака, мг/м ³		
						Допустимое содержание углекислого газа, мг/м ³		
							Допустимое содержание сероводорода, мг/м ³	
	18-21	40-70	0-15	0-4	200	15	2-3	15

Щелевой пол



Для свиноводческих предприятий характерны следующие опасные и вредные производственные факторы:

повышенные
запыленность,
влажность, скорость
движения;

повышенный уровень
шума;

недостаток
естественной и
искусственной
освещенности
рабочей зоны;

повышенное
напряжение в
электрической цепи;

скользкие
поверхности полов;

токсические и
раздражающие
вещества;

животные;

микроорганизмы
(заболевания);

физические
перегрузки;

нервно-психические
перегрузки

Выводы

Для кормления лактирующих свиноматок используется сухой гранулированный корм. Кормление осуществляется 3 раза в сутки. В случае снижения или отсутствия аппетита у свиноматки, оператор обязан сообщить ветеринарному специалисту производства, который устанавливает причину отсутствия аппетита и находит пути устранения патологии.

Возле цеха размещены бункеры для временного хранения комбикормов. Из них корм через приемные горловины попадает в систему цепно-шайбовых транспортеров и распределяется по кормушкам. Кормушки для свиноматок оснащены дозаторами.

Цех оборудован системой поения по трубам из ниппельных автопоилок для свиноматок и поросят-сосунов.

Конструкция современных станков ООО «Белгранкорм» для содержания подсосных свиноматок предусматривает фиксацию свиноматки в боксе, который размещается в станке диагонально или вдоль ограждения станка и обеспечивает свободный подход поросят к свиноматке.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!